

## Skierowanie do Pracowni Diagnostycznej Rezonansu Magnetycznego

Detection mpMRI prostaty  
z podaniem kontrastu  
z opisem PI-RADSV.2.0  
oraz mapą prostaty

Staging mpMRI prostaty  
z podaniem kontrastu

Detection mpMRI prostaty  
bez podania kontrastu

Staging mpMRI prostaty  
bez podania kontrastu

Whole-body MRI  
(w raku prostaty)

Imię i nazwisko Pacjenta

PESEL

Telefon kontaktowy Pacjenta

e-mail

Adres Pacjenta

### Dane kliniczne Pacjenta

Rozpoznanie

ICD 10

Cel badania (z uwagami)

Wynik badania DRE

Aktualny poziom PSA (ng/ml)

Wyniki poprzednich biopsji gruczołu krokowego (jeśli były wykonane)

### Badanie dotychczas wykonane

#### Wynik

4Kscore Test

Test PCA3

Test SelectMDx Liquid Biopsy

<sup>68</sup>Ga-PSMA PET MRI

Rezonans całego ciała  
(whole-body MRI)

### Przygotowanie Pacjenta do badania

1. Zaleca się powstrzymanie od aktywności seksualnych na 3 dni przed badaniem (brak wytrysku).
2. Wypróżnienie jelita grubego bezpośrednio przed badaniem.
3. Przed badaniem należy okazać aktualny wynik badania krwi (nie starszy niż 14 dni), określający stężenie kreatyniny.
4. Prosimy pojawić się około 20 minut wcześniej przed umówioną godziną.
5. Należy przybyć na czczo 4 godziny przed badaniem.
6. Pacjent powinien być minimum 6 tygodni po biopsji gruczołu krokowego.

### W celu opłacenia oraz umówienia badania w określonej placówce prosimy o kontakt z Koordynatorem Pacjenta

Joanna Sitnik tel: +48 512 077 461 lub email: kontakt@hifu.pl

Brak przeciwwskazań do dożylnego podania  
gadolinowego środka kontrastowego oraz buskolinizyny.